

【家庭園芸用マラソン乳剤】2011年11月9日作成

実際に商品を使用する際は、必ず商品に書いてある説明をよく読んで、記載内容に従ってお使いください。

←この色の部分が2011年11月9日付けで変更になりました。(食用プリムラ、食用金魚草、しろうりの適用を削除他)

【適用害虫と使用方法】

※印は収穫物への残留回避のため、その日まで使用できる収穫前の日数と本剤及びマラソンを含む農薬の総使用回数の制限を示します。

| 作物名 | 適用害虫名 | 希釈倍数(倍) | 使用液量 | 使用時期※ | 使用方法 | 総使用回数※ | | |
|-------------------------------|--|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|------|--|----|------|
| 花き類・観葉植物 | アブラムシ類 ハダニ類 アザミウマ類 | 2,000 | 100~ 300 ml/m ² | 発生初期 | 散布 | 6回以内 | | |
| きく | ヨトウムシ類 | | | | | | | |
| サルビア | オンブバッタ | | | | | | | |
| マリーゴールド | ハモグリバエ類 | | | | | | | |
| トマト、ピーマン かぼちゃ | アブラムシ類 ハダニ類 | 1,000 | | 収穫前日まで | | 5回以内 | | |
| なす、すいか | | | | | | 6回以内 | | |
| きゅうり メロン | ウリハムシ | 1,000 | | 収穫前日まで | | 3回以内 | | |
| にがうり | アブラムシ類 | | | | | | | |
| うり類 (漬物用) | アブラムシ類 ハダニ類 | 2,000~ 3,000 | | 100~ 300 ml/m ² | | 収穫3日前まで | 散布 | 5回以内 |
| | ウリハムシ | 1,000 | | | | | | |
| いちご | アブラムシ類 ハダニ類 ミカンキイロアザミウマ | 2,000 | 収穫前日まで | | | | | |
| セルリー、レタス | アブラムシ類 | 1,000 | 収穫3日前まで | | | | | |
| キャベツ、 はくさい | アブラムシ類、アザミウマ類 アオムシ、カブラハバチ | | | | | | | |
| カリフラワー ブロッコリー | アブラムシ類、アザミウマ類 アオムシ | 2,000 1,000 | 収穫14日前まで | | | | | |
| だいこん | アブラムシ類 | 2,000 | 収穫7日前まで | | 6回以内 | | | |
| | アオムシ、ナモグリバエ | 1,000 | | | | | | |
| ねぎ | アブラムシ類、アザミウマ類 | 2,000 | 収穫7日前まで | | 6回以内 | | | |
| | ネギハモグリバエ | 1,000 | | | | | | |
| たまねぎ | アブラムシ類、アザミウマ類 | 2,000 | 収穫14日前まで | 4回以内 | | | | |
| | ハモグリバエ類 | 1,000 | | | | | | |
| にんじん | アブラムシ類、キアゲハ、 ヤサイゾウムシ | 2,000 | 200~ 700 ml/m ² | 収穫7日前まで | 散布 | 6回以内 本剤：5回以内 マラソン：5回 以内(休眠期の 50倍希釈散布 は1回以内) | | |
| ほうれんそう | アブラムシ類 | | | | | | | |
| かぶ | アブラムシ類 | | | | | | | |
| 豆類(未成熟) | アブラムシ類、ハダニ類 コガネムシ類、アザミウマ類 、インゲンテントウ | 1,000 | 200~ 700 ml/m ² | 収穫7日前まで | 散布 | 6回以内 本剤：5回以内 マラソン：5回 以内(休眠期か ら芽出直後ま では1回以内) | | |
| | ハモグリバエ類、カメムシ類 、マメシンクイガ | | | | | | | |
| だいず、あずき、 えんどうまめ、 いんげんまめ | アブラムシ類、ハダニ類 コガネムシ類、アザミウマ類 ハモグリバエ、マメシンクイガ | 2,000 1,000 | | | | | | |
| ぶどう | アブラムシ類、ハダニ類 | 2,000 | 200~ 700 ml/m ² | 収穫7日前まで | 散布 | 6回以内 本剤：5回以内 マラソン：5回 以内(休眠期か ら芽出直後ま では1回以内) | | |
| おうとう | アブラムシ類 | | | | | | | |
| びわ | アブラムシ類 | | | | | | | |
| うめ | アブラムシ類、ハマキムシ類 カイガラムシ類 | | | | | | | |
| りんご | アブラムシ類、ハダニ類 リンゴワタムシ | | | | | | | |
| もも | アブラムシ類、ハダニ類 カイガラムシ類 | 2,000 | 200~ 700 ml/m ² | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | | |
| かんきつ(なつみか んを除く) | アブラムシ類、ハダニ類 ハマキムシ類、カイガラムシ類 | | | | | | | |
| かき | ハマキムシ類、カイガラムシ類 イラガ類 | | | | | | | |

【効果・薬害等の注意】

- ①アルカリ性薬剤、銅剤との混用はさけてください。
- ②衛生害虫の駆除には使用しないでください。
- ③ミカンキイロアザミウマに使用する場合、多発生時には効果が劣ることがありますので、初発生をみたら直ちに散布してください。
- ④適用作物群に属する作物またはその新品種に本剤をはじめて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。
なお、普及指導センター、病害虫防除所または販売店等と相談することが望ましいです。

【安全使用上の注意】 メガネ着用

- ①体調のすぐれない時は散布しないでください。
- ②誤飲に注意してください。
- ③散布液調製時には保護眼鏡を着用し、薬剤が眼に入らないように注意してください。眼に入った場合は直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください（刺激性）。
- ④皮ふに付着しないように注意してください。皮ふに付いた場合は直ちに石けんでよく洗い落としてください（弱い刺激性）。
- ⑤かぶれやすい人は取扱に十分注意してください。
- ⑥自動車、壁などの塗装面に散布液がかからないように注意してください（変色）。
- ⑦作業中や、散布当日は散布区域に小児やペットが立ち入らないように配慮してください。風向きなどを考え周辺の人家、洗濯物、ペット、玩具などに散布液がかからないように注意してください。
- ⑧散布液が水槽、池、河川などに入らないように注意してください。
- ⑨蚕に対して影響がありますので周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
- ⑩ミツバチに対して影響があるので以下のことに注意してください。
 - ・ミツバチの巣箱及びその周辺にかからないようにしてください。
 - ・受粉促進を目的としてミツバチ等を放飼中の施設や果樹園等では使用をさけてください。
 - ・養蜂が行なわれている地区では周辺への飛散に注意する等、ミツバチの危害防止に努めてください。
- ⑪使用後の空容器は3回以上洗浄してから処理してください。

治療法：硫酸アトロピン製剤及びPAM製剤の投与が有効です。

魚毒性：

- ①水産動植物（甲殻類）に影響を及ぼす恐れがありますので、河川、養殖池等に飛散・流入しないよう注意して使用してください。
- ②使用残りの薬液が生じないように調整を行い、使い切ってください。また、空容器、空袋等は水産動植物等に影響を与えないよう適切に処理してください。