

**表示変更ラベル**

登録番号	薬効分野	農薬の名称	農薬の種類
21939	殺虫剤	家庭園芸用スミチオン乳剤	MEP乳剤

上記農薬について、平成22年10月27日付で以下の変更が登録されました。

**【変更事項】**

作物名	項目	変更前	変更後
かき	使用時期	収穫30日前まで	収穫45日前まで
	MEPを含む農薬の総使用回数	3回以内	3回以内(樹幹処理は2回以内)
もも	MEPを含む農薬の総使用回数	6回以内	6回以内(樹幹処理は1回以内)
かんきつ	作物名	かんきつ	みかん なつみかん
	「アブラムシ類」の希釈倍数	1000倍	1000~2000倍
みかん	MEPを含む農薬の総使用回数	5回以内	5回以内(樹幹処理は1回以内)
	「アブラムシ類」の希釈倍数	1000倍	1000~2000倍
なつみかん	使用時期	収穫14日前まで	収穫21日前まで
	本剤の使用回数	5回以内	3回以内
	MEPを含む農薬の総使用回数	5回以内	3回以内(樹幹処理は1回以内)
大粒種ぶどう	使用時期	収穫21日前まで	収穫30日前まで
大粒種ぶどう、 小粒種ぶどう	「アブラムシ類、ブドウスカシバ、 ブドウトリバ」の希釈倍数	1000倍	1000~2000倍
おうとう	使用時期	収穫14日前まで	収穫21日前まで
	希釈倍数	1000倍	1000~2000倍
	MEPを含む農薬の総使用回数	2回以内	2回以内 (樹幹処理及び 灌注処理は合計1回以内)
いちご(露地栽培)	使用時期	収穫7日前まで	収穫21日前まで
ねぎ	使用時期	収穫14日前まで	収穫21日前まで
トマト	使用時期	収穫7日前まで	収穫開始14日前まで
えんどうまめ	使用時期	収穫21日前まで	収穫30日前まで
だいず、いんげんまめ、 らっかせい	作物名	だいず、いんげんまめ、 らっかせい	豆類(種実、但し、あずき、 えんどうまめ、そらまめを除く)
豆類 (未成熟、但し、さやいんげん、 未成熟そらまめを除く)	作物名	豆類(未成熟、但し、 さやいんげん、未成熟 そらまめを除く)	豆類(未成熟、但し、 未成熟そらまめを除く)
豆類 (未成熟、但し、 未成熟そらまめを除く)	使用時期	収穫30日前まで	収穫21日前まで
かんしょ	適用病害虫名	—	ヨツモンカメノコハムシ
樹木類	「アメリカシロヒトリ」の希釈倍数	1000倍	500~1000倍

：制限事項

住友化学園芸株式会社 ◆ 住友化学株式会社

パターンE

**当該作物の変更後の【適用病害虫名と使用方法】**

\*印は収穫物への残留回避のため、本剤及びその有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示す。

作物名	適用病害虫名	希釈倍数 (倍)	10アール当り 使用液量	使用時期	使用 方法	総使用回数*	
						本剤	MEP剤
かき	カキノヘタムシガ、 カキホソガ、 フジコナカイガラムシ、 オオワタコナカイガラムシ、 カメムシ類、 イラガ類、 ミノガ類若齢幼虫	1000	200~700 ℓ	収穫45日前まで	散布	3回	3回 (樹幹処理は2回)
もも	アブラムシ類、 モモハモグリガ、 モモシンクイガ、 クワシロカイガラムシ、 カメムシ類	1000~2000		収穫3日前まで		6回	6回 (樹幹処理は1回)
みかん	アブラムシ類、 ハマキムシ類、 サンホーゼカイガラムシ、 カメムシ類、 ゴアオハナムグリ	1000	収穫14日前まで	5回		5回 (樹幹処理は1回)	
なつみかん	アブラムシ類、 ハマキムシ類、 サンホーゼカイガラムシ、 カメムシ類、 ゴアオハナムグリ	1000~2000	収穫21日前まで	3回		3回 (樹幹処理は1回)	
大粒種ぶどう	アブラムシ類、 ブドウスカシバ、 ブドウトリバ	1000~2000	収穫30日前まで	2回		4回 (収穫終了後から、 萌芽までは2回、 萌芽後は2回)	
小粒種ぶどう	アブラムシ類、 ブドウスカシバ、 ブドウトリバ	1000	収穫90日前まで				
おうとう	アブラムシ類	1000~2000	収穫21日前まで	2回	2回 (樹幹処理及び 灌注処理は 合計1回)		
いちご(露地栽培)	アブラムシ類、 アザミウマ類、 ネギコガ	2000	収穫開始14日前まで	2回	2回		
ねぎ	アブラムシ類、 アザミウマ類、 ネギコガ	1000	収穫21日前まで	4回	4回		
トマト	アブラムシ類、 オオニジュウヤホシテントウ	2000	収穫21日前まで				
豆類 (種実、但し、 あずき、 えんどうまめ、 そらまめを除く)	シロイチモシマダラメイガ、 ダイズサヤタマバエ、 カメムシ類、 マメヒメサヤムシガ、 アブラムシ類、 マメシンクイガ	1000	収穫30日前まで				
豆類 (未成熟、但し、 未成熟そらまめ を除く)	イモコガ、 アブラムシ類、 ヨツモンカメノコハムシ	500~1000	収穫21日前まで				
かんしょ	アメリカシロヒトリ	1000	収穫7日前まで	5回	5回		
樹木類	アブラムシ類、 グンバイムシ類	1000	—	6回	6回		

註) 使用液量：果樹・庭木----- 200~700 ℓ / 10a  
野菜・豆類・いも類・花卉----- 100~300 ℓ / 10a

パターンE