

ベニカマイルドスプレー 2011年9月21日作成

ベニカマイルドは登録商標

実際に使用する際は、必ず商品に書いてある説明をよく読んで、記載内容に従ってお使いください。

←この色の部分が 2011 年 9 月 21 日付けで変更になりました。

【適用病害虫と使用方法】

※印は本剤及びその有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示す。

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用時期	総使用回数※	使用方法
かんきつ	アブラムシ類 ミカンハダニ	原液	収穫前日 まで	—	散布
果樹類 (かんきつを 除く)	アブラムシ類				
野菜類 豆類(種実) いも類	アブラムシ類 コナジラミ類 ハダニ類 うどんこ病				
ごま	アブラムシ類				
花き類・観葉植物	アブラムシ類 ハダニ類 うどんこ病		発生初期		

【効果・薬害等の注意】

- 凍結した場合、解凍後、白濁することがあるが、その場合はよく振り混ぜてから使用する。
- 散布液が直接害虫にかからないと効果がないため、葉の表裏の害虫にむらなく薬液がかかるよう丁寧に散布する。
- 害虫の卵には効果がなく、残効も短いため、夏期高温時など害虫の増殖や外部からの飛び込みが活発なときには、5～7日間隔の連続散布や他剤との輪番で使用する。
- いちごに使用する場合、高温時の使用は避ける(薬害)。
- 使用に当たっては、使用時期、使用方法などを誤らないよう注意する。
- カーネーションに使用する場合、茎葉のワックス層が溶け、白っぽい茎葉が濃緑色なる等の薬害を生ずる場合があるので、初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用する。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用する。

【安全使用上の注意】

- 体調のすぐれない時は散布しない。
- 風向きなどを考え周辺の人家、自動車、壁、洗濯物、ペット、玩具などに散布液がかからないように注意。
- 使用後の空容器は3回以上洗浄してから処理する。

保管：飲食物・食器類やペットの餌と区別し、直射日光をさけ、密閉して、小児の手の届かないなるべく低温な場所に横にしないで立てて保管。