

ベンレート水和剤

(農林水産省登録第 20889 号・ベノミル水和剤)

【変更事項】 2008 年 11 月 5 日付けで以下の変更が登録されました。

作物名	項目	変更前	変更後
りんご	使用時期	収穫 7 日前まで	収穫前日まで
	本剤の使用回数	6 回以内	3 回以内
	ベノミルを含む農薬の総使用回数		
アスパラガス	使用時期	収穫 3 日前まで	収穫前日まで
いちご	炭そ病の使用時期	仮植時又は本圃定植後 (但し収穫 90 日前まで)	仮植時又は本圃定植後 (但し収穫 30 日前まで)

【追加事項】 2008 年 9 月 25 日付けで以下の適用拡大が登録されました。

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ベノミルを含む農薬の総使用回数
水稲 (箱育苗)	苗立枯病 (トリコテリウム菌)	1,000 倍	は種時 1 回又は、は種時と は種 7 日後頃の 2 回	2 回以内	育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌約 5ℓ) 1 箱当 り 1ℓ 灌注	2 回以内 (種子への処理は 1 回以内)
	いもち病		は種時～は種 7 日後頃			
なし	胴枯病	2,000 倍	収穫 7 日前まで	6 回以内	散布	6 回以内 (塗布は 2 回以内)
あんず	黒星病 すす斑症	3,000 倍		1 回		
いちご	炭そ病 萎黄病	500 倍	ポット育苗期間	3 回以内 (本圃定 植後は 1 回以内)	1 株当り 100ml 灌注	4 回以内 (種子粉衣は 1 回以内、は種後は 3 回以内 (本圃定植後は 1 回以内))
はくさい	白斑病	2,000 倍	収穫 14 日前まで	4 回以内	散布	5 回以内 (種子粉衣は 1 回以内、は種後は 4 回以内)
セネガ	黒根病	1,000 倍	収穫 30 日前まで	3 回以内	1 m ² 当り 3ℓ 灌注	3 回以内