

【家庭園芸用カリグリーン®】2014年4月24日作成

←この色の部分が2014年4月9日付で変更になりました。

カリグリーンはOATアグリオ(株)の登録商標

実際に商品を使用する際は、必ず商品に書いてある説明をよく読んで、記載内容に従ってお使いください。

【適用病害と使用方法】※印は収穫物への残留回避のため、本剤及び炭酸水素カリウムを含む農薬の総使用回数の制限を示します。

作物名	適用病害名	希釈倍数	散布量	使用時期	総使用回数※	使用方法
花き類・観葉植物	うどんこ病	800倍	150~500ml/m ²	発病初期	—	散布
野菜類 (トマト、ミニト マトを除く)	うどんこ病	800~1,000倍	100~300ml/m ²	収穫前日 まで		
	さび病 灰色かび病	800倍				
トマト ミニトマト	うどんこ病	800~1,000倍				
	さび病 灰色かび病 葉かび病	800倍				
	ブルーベリー	灰色かび病	800倍	200~700ml/m ²		
りんご	うどんこ病	500倍	60~150ml/m ²			
麦類						

【効果・薬害等の注意】

- ①使用の際は展着剤を加用することが望ましいです。
- ②本剤は、病害の発生初期に散布してください。なお多発生の場合は効果の劣ることがありますので、所定範囲の高濃度で使用してください。
- ③散布量は対象作物の生育段階、栽培形態及び散布方法に合わせて調整してください。
- ④かぼちゃのうどんこ病に使用する場合、効果がやや低いので、多発生時には散布間隔を短くし、十分な散布量を確保してください。
- ⑤メロンに使用する場合、葉に軽微な褐点、もしくは軽い縮葉症状を生じることがありますので留意してください。
- ⑥本剤の使用に当っては使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所又は販売店等と相談することが望ましいです。
- ⑦適用作物群に属する作物またはその新品種に本剤をはじめて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、農業改良普及センター、病害虫防除所または販売店等と相談することが望ましいです。

【安全使用上の注意】

- ①本剤は眼に対して刺激性がありますので眼に入らないように注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。使用後は洗眼してください。
- ②本剤は皮ふに対して弱い刺激性がありますので皮ふに付着しないように注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。

魚毒性：本剤は魚介類に影響を及ぼしますが、通常の使用方法では問題はありません。