

【テルスター®スプレー】2008年11月5日作成

テルスターは米国 FMC 社の登録商標

←この色の部分が 2008 年 10 月 1 日付けで変更になりました。

実際に商品を使用する際は、必ず商品に書いてある説明をよく読んで、記載内容に従ってお使いください。

### 【適用害虫と使用方法】

※印は本剤及びピフェントリンを含む農薬の総使用回数の制限を示します。

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用時期	総使用回数※	使用方法
ばら	アブラムシ類 ハダニ類	原液	発生初期	—	散布
きく	ハダニ類				
つばき類	チャドクガ				
さくら	アメリカシロヒトリ				

### 【効果・薬害等の注意】

- ①希釈せずそのまま散布してください。
- ②使用に当っては、使用時期、使用方法などを誤らないように注意してください。
- ③適用作物群に属する作物又はその新品種にはじめて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお病虫害防除所又は販売店等と相談することが望ましいです。

### 【安全使用上の注意】

マスク着用

カイコ注意

- ①体調のすぐれない時は散布しないでください。
- ②人やペット、水産動物を飼っている水槽等に向かって噴射しないでください。
- ③眼に入らないように注意してください。眼に入った場合は直ちに水洗してください（弱い刺激性）。
- ④散布時は、農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをして衣服を換えてください。作業時の衣服等は他と分けて洗濯し、養蚕作業の衣服類と区別してください。
- ⑤風向きなどを考え周辺の人家、自動車、壁などの塗装面等、洗濯物、ペット、玩具などに散布液がかからないように注意してください。
- ⑥作業中や、散布当日は散布区域に小児やペットが立ち入らないように配慮してください。
- ⑦蚕に長期間毒性がありますので、付近に桑園があるところでは使用しないでください。
- ⑧ミツバチに影響がありますので、注意して使用してください。

治療法：筋弛緩剤（メトカルバモール製剤等）の投与が有効です（動物実験で報告）。

魚毒性：**魚介類注意**ごく低濃度で水産動物に強い影響があります。河川、湖沼、海域、養殖池に飛散・流入するおそれのある場所では使用しないでください。容器等の洗浄水は河川等に流さないでください。周囲に影響のない地点を選び、土壌表面に散布する等の処理をしてください。使用後の空容器等は水産動物に影響を与えないよう、3回以上洗浄してから処理してください。