

パイベニカ®スプレー 2013年9月11日作成

パイベニカは登録商標

実際に使用する際は、必ず商品に書いてある説明をよく読んで、記載内容に従ってお使いください。

←この色の部分が2013年9月11日付けで変更になりました。

殺虫剤

野菜に速効性 天然成分(除虫菊)でしっかり退治

有機農産物栽培(有機 JAS)に

パイベニカ®Vスプレー

有効成分:ピレトリン・・・0.0060%

農林水産省登録:第23109号 性状:類白色乳濁液体

有効年限:3年

容量:1000ml

(パイベニカは登録商標)

特長

- 効き目が確かな天然成分(除虫菊)で害虫をすばやく退治します。
- キャベツ、こまつなのアオムシ、なすのテントウムシダマシにも有効です。

効果・薬害等の注意

- 使用に当っては使用方法などを誤らないように注意。
- 発生密度が高くなると効果が劣る場合があるので、発生初期に散布することが望ましい。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤をはじめて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用する。なお、病虫害防除所または販売店等と相談することが望ましい。

安全使用上の注意 **マスク着用**

- 体調のすぐれない時は散布しない。
- 人に向かって噴射しない。
- 散布時は、農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用する。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをする。
- かぶれやすい人は取扱いに十分注意。
- 風向きなどを考え周辺の人家、自動車、壁、洗濯物、ペット、玩具などに散布液がかからないように注意。
- ミツバチ及び蚕に影響があるので、注意して使用する。
- 使用後の空容器は3回以上洗浄してから処理する。

適用害虫と使用方法

※印は収穫物への残留回避のため、本剤及びその有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示す。

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用時期	総使用回数※	使用方法
トマト	アブラムシ類	原液	収穫前日まで	6回以内	散布
ミニトマト					
いちご					
きゅうり	アブラムシ類、 オンシツコナジラミ		5回以内		
なす	アブラムシ類、テントウムシダマシ類、 ハダニ類				
キャベツ	アブラムシ類、アオムシ・コナガ		収穫7日前まで	2回以内	
こまつな	アブラムシ類、アオムシ				
花き類・観葉植物	アブラムシ類	-	6回以内		