

ST ゼンターリ顆粒水和剤

有効成分：バチルス・チューリングゲンシス菌の生芽胞及び産生結晶毒素

(力価として 1000B.m.z 単位/mg) …10.0%

農林水産省登録 第 21734 号

※ 印は本剤及びその有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示します。

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	総使用回数※	使用方法
キャベツ	アオムシ、コナガ、ヨトウムシ	1,000 ～ 2,000 倍	100 ～ 300mL/m ²	発生初期(但し、収穫前日まで)	-	散布
	オオタバコガ、シロイチモジヨトウ、ネギアザミウマ、ハスモンヨトウ	1,000 倍				
はくさい	アオムシ、コナガ、ヨトウムシ	2,000 倍				
野菜類（キャベツ、はくさいを除く）		1,000 ～ 2,000 倍				
	オオタバコガ、シロイチモジヨトウ、ハスモンヨトウ	1,000 倍				
トマト、ミニトマト	トマトキバガ					
うり科野菜類	ウリノメイガ					
パセリ	キアゲハ					
いも類、豆類（種実）	ハスモンヨトウ					
えんどうまめ、さやえんどう、実えんどう	ウリノメイガ					
ふじまめ	シロイチモジマダラメイガ					
しょくようほおずき	タバコガ					

果樹類	ハマキムシ類		200 ～			
樹木類	ケムシ類		700mL/m ²	発生初期		
とうもろこし	オオタバコガ					
からしな(種子)	アオムシ、コナガ、ヨトウムシ	1,000 ～ 2,000 倍				
ぺぼかぼちゃ(種子)	ヨトウムシ	1,000 倍	100 ～ 300mL/m ²	発生初期(但し、収穫前日まで)		
そば	ハスモンヨトウ	2,000 倍				
あわ、ひえ	アワノメイガ					
えごま(種子)	ベニフキノメイガ	1,000 倍				
しいたけ	シイタケオオヒロズコガ	200 倍	種 菌 シ ー ト (30×25cm) あたり 20mL	種菌接種前		形成種菌の ふたに塗布
			100 ～ 300mL/m ²	害虫発生初期 (但し、しいたけ発生の 14 日前まで)		
茶	チャノコカクモンハマキ、チャハマキ、ヨモギエダシャク	1,000 倍	200 ～ 400mL/m ²	発生初期 (但し、摘採 7 日前まで)		
きく	ハスモンヨトウ					
カーネーション			100 ～ 300mL/m ²			
ストック	コナガ			発生初期		散布
芝	スジキリヨトウ、シバツトガ	1,000 ～ 2,000 倍	300mL/m ²			
	タマナヤガ	1,000 倍				

- 2009 年 12 月 16 日付：使用回数の変更
- 2015 年 5 月 13 日付：あわ、ひえ、えごま(種子)の追加。使用量の欄を追加
- 2023 年 3 月 8 日付：キャベツ、ぺぼかぼちゃ(種子)の追加。野菜類(キャベツ、はくさいを除く)の変更。しいたけの使用量の変更
- 2024 年 11 月 27 日：トマト、ミニトマトの追加