

使用者の皆さまへ

**家庭園芸用
GFオルトラン® 粒剤**
(農林水産省登録第 21789 号)

**登録内容変更
についてお願い**

日本では、農薬の安全性を一層担保するために、今年から急性暴露評価が導入されることになりました。この評価にあたり、**家庭園芸用GFオルトラン粒剤**は自主的に登録縮小の申請を致しました。

これは、現在登録されている使用方法で想定される最大の農薬残留が認められる作物を、たとえ通常より非常に多く 1 日に摂取した場合でも、健康に影響を与えないようにするためです。このため、使用者の皆さまにおかれましては、以下の新しい登録予定内容にてご使用いただきますようお願い致します。

●農薬登録の削除作物について

下記、登録削除作物での家庭園芸用GFオルトラン粒剤の使用をしないようお願いします。

家庭園芸用 GF オルトラン粒剤

作物名	
ミニトマト	はつかだいこん

●使用方法の変更作物について

家庭園芸用GFオルトラン粒剤は、表の農薬登録申請内容のとおり農薬登録の縮小申請をしました。

今後は、表のとおりの農薬登録されている**使用方法の変更申請内容**においてご使用願います。

但し、申請内容は今後変更になる可能性がありますのでご了承ください。

使用上の注意事項などについては、製品ラベルをご参照ください。

<裏面もご覧ください>

【表 家庭園芸用GFオルトラン粒剤

平成 26 年 7 月 2 日 使用方法変更 申請内容 (登録縮小部分のみ)】

※印は本剤及びその有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示す。

作物名	適用害虫名	使用量	使用時期	総使用回数 ※	使用方法
きゅうり なす	アブラムシ類 アザミウマ類 オンシツコナジラミ	3~6g/m ² (1株当り 1~2g)	定植時	1回	植溝又は 植穴処理
トマト	アブラムシ類 オンシツコナジラミ				株元散布
ピーマン	アブラムシ類	1株当り2g 6g/m ²	育苗期		散布
キャベツ	アオムシ コナガ ヨトウムシ アブラムシ類	3~6g/m ² (1株当り 1~2g)	定植時	本剤：1回 アセフェート：2回以内 (定植時までの処理は1回以内、 定植後は1回以内)	植穴処理
はくさい					
ブロッコリー	ヨトウムシ	6g/m ² (1株当り2g)		1回	株元散布
だいこん	アオムシ コナガ アブラムシ類	3~4g/m ²	は種前		植溝散布
かぶ		4g/m ²	収穫21日前まで	1回	株元散布
ばれいしょ	アブラムシ類	3~6g/m ² (1株当り 1~2g)	植付時	本剤：1回 アセフェート：3回以内 (植付時の処理は1回以内、 植付後は2回以内)	植溝散布

<裏面もご覧ください>

家庭園芸用 GF オルトラン粒剤では、下表の農薬登録の変更の申請をしました。
 今後は、下表の使用方法のとおり家庭園芸用 GF オルトラン粒剤を使用してください。
 但し、申請内容は今後変更になる可能性がありますのでご了承ください。

作物名	適用害虫名	使用量	使用時期	総使用回数※	使用方法	
きく	ヨトウムシ類、 ネキリムシ類、 ハモグリバエ類	6 g/m ²	発生初期	5回以内	株元散布	
	アブラムシ類、 アザミウマ類	3～6 g/m ²				
宿根スターチス	ヨトウムシ類、 コガネムシ類幼虫	6 g/m ²				
カーネーション	ヨトウムシ類、 コナガ	3～6 g/m ²				
アリウム	アブラムシ類、 アザミウマ類					
	ヨトウムシ類、 ネギコガ	6 g/m ²				
花き類・観葉植物 (きく、宿根スターチス、カーネーション、アリウムを除く)	アブラムシ類、 アザミウマ類	3～6 g/m ²				
	ヨトウムシ類	6 g/m ²				
芝	スジキリヨトウ、 シバツトガ	10 g/m ²				全面散布
	タマナヤガ	5～10 g/m ²				
きゅうり、 なす	アブラムシ類、 アザミウマ類、 オンシツコナジラミ	3～6 g/m ² (1株当り1～2g)	定植時	1回	植溝散布又は 植穴処理	
トマト	アブラムシ類、 オンシツコナジラミ					
ピーマン	アブラムシ類	1株当り2g	育苗期	本剤：1回 アセフェート：2回以内 (定植時までの処理は1回以内、 定植後の散布は1回以内)	株元散布	
キャベツ		6 g/m ²				
はくさい	アオムシ、 コナガ、 ヨトウムシ、 アブラムシ類	3～6 g/m ² (1株当り1～2g)	定植時	1回	散布	
なばな	アブラムシ類		定植時 は種時			
ブロッコリー	ヨトウムシ	6 g/m ² (1株当り2g)	定植時	1回	植溝土壌混和 播溝土壌混和	
だいこん	アオムシ、 コナガ、 アブラムシ類	3～4 g/m ²	は種前		株元散布	
かぶ	アブラムシ類	4 g/m ²	収穫21日前まで	本剤：1回 アセフェート3回以内 (植付時の処理は1回以内、 植付後は2回以内)	植溝散布	
ばれいしょ		3～6 g/m ² (1株当り1～2g)	植付時		株元散布	
えだまめ	ハスモンヨトウ	3～6 g/m ²	収穫21日前まで	3回以内	生育期株元散布	