

実際に商品を使用する際は、必ず商品に書いてある説明をよく読んで、記載内容に従ってお使いください。

【適用病害虫と使用方法】 ←この色の部分が2016年3月16日付けで変更になりました。

※印は本剤及びそれぞれの有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示す。

作物名	適用病害虫名	総使用回数※	使用方法
まさき、ぼけ	ケムシ類、カイガラムシ類、ロウムシ類	本剤:6回以内 プロフェジン:6回以内 ペルメリン:6回以内 マイクロブタニル:6回以内	30cm以上離れた所から数回断続して噴射する。
樹木類(まさき、ぼけを除く)	ケムシ類、カイガラムシ類		
ばら	アブラムシ類、チュウレンジハバチ、うどんこ病、黒星病	本剤:5回以内 プロフェジン:6回以内 ペルメリン:6回以内 マイクロブタニル:5回以内	
きく	アブラムシ類、白さび病		

【効果・薬害等の注意】

- 植物から30cm以上離して、噴霧が均一に付着するように1～2秒間ずつ数回断続的に噴射してください。特に新芽・新葉・蕾・花弁などには注意してください(冷害・変色)。
- 日中高温時、強風時、降雨の恐れがある時は使用しないでください(薬害・効果)。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種にはじめて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。

【安全使用上の注意】 マスク着用

- 体調のすぐれない時、妊娠中、飲酒後等には使用しないでください、室内及び人体に向かって噴射しないでください。
- 取扱には注意してください。
- 眼に入らないように注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。(刺激性)。
- 使用の際は、農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに洗眼してください。
- 作業中や、散布当日は散布区域に小児やペットが立ち入らないように配慮してください。
- ミツバチ及び蚕に影響がありますので、注意して使用してください。
- 噴霧が自動車等にかかるとう塗装面が変色することがあるので注意してください。
- 風向きなどを考え周辺の人家、自動車、壁、ペット、洗濯物、玩具などに散布液がかからないように注意してください。
- 使用後の空缶は、火気のない野外で噴射音が消えるまでガスを抜いたことを確認した後処理してください。