

ベニカグリーン®Vスプレー

実際に使用する際は、必ず商品に書いてある説明をよく読んで、記載内容に従ってお使いください。

←この色の部分が 2011 年 5 月 18 日付けで変更になりました。

[適用病害虫と使用方法]

※印は収穫物への残留回避ため、本剤及びそれぞれの有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示す。

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用時期	総使用回数※	使用方法
トマト	アブラムシ類 葉かび病	原液	収穫前日まで	3回以内	散布
きゅうり	アブラムシ類 うどんこ病			5回以内	
なす	コナジラミ類 うどんこ病			本剤：4回以内 フェンプロパトリン：5回以内 ミクロブタニル：4回以内	
いちご	アブラムシ類 ハダニ類 うどんこ病			3回以内	
ばら	アブラムシ類 チュウレンジハバチ ハダニ類 うどんこ病 黒星病		—	本剤：5回以内 フェンプロパトリン：6回以内 ミクロブタニル：5回以内	
きく	アブラムシ類 うどんこ病 白さび病				
はぼたん	アブラムシ類 アオムシ うどんこ病				
マリーゴールド	アブラムシ類 ハスモンヨトウ うどんこ病				
カーネーション	アブラムシ類 ハダニ類 うどんこ病				
花き類・観葉植物 (ばら、きく、はぼたん、マリーゴールド、カーネーションを除く)	アブラムシ類 うどんこ病				
つばき類	チャドクガ ツノロウムシ				

つつじ類	ツツジゲンバイ				
さくら	アメリカシロヒトリ				

【効果・薬害等の注意】

- 使用に当っては使用方法などを誤らないよう注意してください。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお病害虫防除所または販売店等と相談することが望ましいです。

【安全使用上の注意】 **マスクマーク**

- 体調のすぐれない時は散布しないでください。
- 人に向かって噴射しないでください。
- 散布時は、農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖作業衣などを着用してください。
- 本剤は、のど、鼻、皮ふなどを刺激する場合、また、かゆみを生じる場合があるので注意してください。
- かぶれやすい人は取扱いに十分注意してください。
- 皮ふに付着しないように注意。付着した場合には直ちに石けんで洗い落としてください（弱い刺激性）。
- 風向きなどを考え周辺の人家、自動車、壁、洗濯物、ペット、玩具などに散布液がかからないように注意してください。
- ミツバチ及び蚕に影響がありますので注意して使用してください。
- 街路、公園等で散布する場合は、散布中及び散布後（少なくとも散布当日）に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。
- 使用後の空容器は3回以上洗浄してから処理する。

保管：飲食物・食器類やペットの餌と区別し、直射日光をさけ、密閉して、小児の手の届かない冷涼な場所に横にしないで立てて保管。

治療法：フェンプロパトリンには、メトカルバモール製剤の投与が有効（動物実験で報告）。