

ベニカ®Jスプレー 2013年9月11日作成

ベニカは登録商標

実際に使用する際は、必ず商品に書いてある説明をよく読んで、記載内容に従ってお使いください。

←この色の部分が2013年9月11日付けで変更になりました。

殺虫剤

庭木のケムシ退治 かなめもちのイラガにも

速効性ジェットタイプ 直噴最長 5m

近寄りたくない害虫を遠くからねらい撃ち

# ベニカ®Jスプレー

有効成分：クロチアニジン[(E)-1-(2-クロロ-1,3-チアゾール-5-イルメチル)-3-メチル-2-ニトログアニジン]・・・0.0080%

フェンプロパトリン[(RS)- $\alpha$ -シアノ-3-フェノキシベンジル=2,2,3,3-テトラメチルシクロプロパンカルボキシラート]・・・0.010%

農林水産省登録：第23130号 性状：無色透明液体

有効年限：3年

容量：1000ml

(ベニカは登録商標)

## 特長

- 直噴散布でケムシ、イラガなど高い所や近寄りたくない害虫を遠くからねらい撃ちできます。
- ケムシには速効性と1週間の持続性(チャドクガ、アメリカシロヒトリ・若令幼虫)があり、散布後に発生した害虫も退治します。
- 浸透移行性により葉の中や散布液がかかりにくい場所に生息している害虫にも効果的です。

## 適用害虫と使用方法

※印は本剤及びその有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示す。

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用時期	総使用回数※	使用方法
つばき類	ケムシ類、ツノロウムシ	原液	発生初期	本剤：4回以内 クロチアニジン：6回以内 フェンプロパトリン：6回以内	散布
つつじ類	ケムシ類、ツツジゲンバイ			本剤：4回以内 クロチアニジン：4回以内 フェンプロパトリン：6回以内	
さるすべり	ケムシ類、サルスベリフクロカイガラムシ			6回以内	
かなめもち	ケムシ類、イラガ類			本剤：4回以内 クロチアニジン：4回以内 フェンプロパトリン：6回以内	
樹木類 (つつじ類、つばき類、さるすべり、かなめもちを除く)	ケムシ類				
ガーベラ	アブラムシ類、コナジラミ類				
カトレア	アブラムシ類				
ばら	アブラムシ類、ハダニ類、チュウレンジハバチ				
きく	アブラムシ類、ハモグリバエ類				
花き類・観葉植物 (ばら、きく、ガーベラ、カトレアを除く)	アブラムシ類				

## 効果・薬害等の注意

- 使用に当っては使用方法などを誤らないように注意。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤をはじめて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用する。

安全使用上の注意 **マスク着用**

- 体調のすぐれない時は散布しない。
- 人に向かって噴射しない。
- 本剤はのど、鼻、皮膚などを刺激する場合、また、かゆみを生じる場合があるので注意。
- 散布時は、農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用する。
- 風向きなどを考え周辺の人家、自動車、壁、洗濯物、ベット、玩具などに散布液がかからないように注意。
- ミツバチ及び蚕に影響があるので、注意して使用する。
- 街路、公園等で使用する場合は、散布中及び散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払う。
- 使用後の空容器は3回以上洗浄してから処理する。