

実際に商品を使用する際は、必ず商品に書いてある説明をよく読んで、記載内容に従ってお使いください。

←この色の部分が2013年5月29日付けで変更になりました。

【適用害虫と使用方法】

※印は収穫物への残留回避のため、本剤及びニテンピラムを含む農薬の総使用回数の制限を示します。

| 作物名                   | 適用害虫名                           | 使用量   | 使用時期      | 総使用回数※  | 使用方法                        |
|-----------------------|---------------------------------|---|-----------|---|-----------------------------|
| 花き類・観葉植物（きく、きんせんかを除く） | アブラムシ類                          | 1～2g/株  | 発生初期      | 4回以内  | 生育期株元散布                     |
|                       |                                 | 3～5g/培土 <sup>※</sup>                                    | 定植前       | 本剤：1回<br>ニテンピラム：4回  | 培土混和                        |
| きく                    | アブラムシ類                          | 1～2g/株  | 発生初期      | 4回以内  | 生育期株元散布                     |
|                       | ミカンキイロアザミウマ<br>マメハモグリバエ         | 2g/株  |           |   |                             |
| きんせんか                 | アブラムシ類                          | 1～2g/株  | 発生初期      | 4回以内  | 生育期株元散布                     |
| なす                    | アブラムシ類<br>ミナミキイロアザミウマ<br>コナジラミ類 | 1～2g/株  | 定植時       | 本剤：1回<br>ニテンピラム：4回以内（育苗培土混和及び育苗期の株元処理及び定植時の土壌混和は合計1回以内、定植後は3回以内）      | 植穴処理土壌混和                    |
|                       | アブラムシ類<br>コナジラミ類                | 1g/株  | 育苗期後半     |   | 株元処理                        |
|                       | アブラムシ類                          | 5g/培土 <sup>※</sup>                                      | は種時又は鉢上げ時 |   | 育苗培土混和                      |
|                       |                                 | 2g/株  | 収穫前日まで    |   | 生育期株元散布                     |
| トマト<br>ミニトマト          | マメハモグリバエ                        | 2g/株  | 定植時       | 本剤：1回<br>ニテンピラム：4回以内（育苗培土混和、育苗期の株元処理及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布は3回以内）        | 植穴処理土壌混和                    |
|                       | アブラムシ類                          | 1g/株  | 育苗期       |   | 株元処理                        |
|                       | アブラムシ類<br>コナジラミ類                | 1～2g/株  | 定植時       |   | 植穴処理土壌混和                    |
|                       | コナジラミ類                          | 5g/培土 <sup>※</sup>                                      | は種時又は鉢上げ時 |   | 育苗培土混和                      |
|                       | コナジラミ類                          | 1～2g/株  | 育苗期       |   | 株元処理                        |
| きゅうり                  | アブラムシ類<br>コナジラミ類                | 1g/株  | 育苗期       | 本剤：1回<br>ニテンピラム：4回以内（育苗期の株元処理及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布は3回以内）               | 株元処理                        |
|                       | アブラムシ類<br>コナジラミ類<br>ミナミキイロアザミウマ | 1～2g/株  | 定植時       |   | 植穴処理土壌混和                    |
| ピーマン<br>ししとう          | アブラムシ類<br>ミナミキイロアザミウマ           | 1～2g/株  | 定植時       | 本剤：1回<br>ニテンピラム：4回以内（育苗期の株元処理及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布は3回以内）               | 株元処理                        |
|                       | アブラムシ類<br>コナジラミ類                | 1g/株  | 育苗期       |   |                             |
| メロン                   | アブラムシ類<br>コナジラミ類                | 1g/株<br>1～2g/株  | 定植時       | 本剤：1回<br>ニテンピラム：4回以内（育苗期の株元処理及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布は3回以内）               | 植穴処理土壌混和                    |
|                       | ミナミキイロアザミウマ                     | 2g/株  |           |   |                             |
| すいか                   | アブラムシ類<br>コナジラミ類<br>ミナミキイロアザミウマ | 1～2g/株  | 定植時       | 本剤：1回<br>ニテンピラム：4回以内（育苗期の株元処理及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布は3回以内）               | 株元処理                        |
|                       | アブラムシ類<br>コナジラミ類                | 1g/株  | 育苗期       |   |                             |
| いちご                   | アブラムシ類                          | 1g/株  | 定植時       | 本剤：1回<br>ニテンピラム：4回以内（育苗培土混和、定植時の土壌混和及び定植当日の散布は合計1回以内、株元処理及び散布は合計3回以内） | 植穴処理土壌混和                    |
| ねぎ                    | ネギアザミウマ                         | セル成型育苗トレイ<br>1箱またはペーパー<br>ポット1冊(30×60cm・使用土壌約3～4L)当り50g | 定植時       | 本剤：1回<br>ニテンピラム：4回以内（育苗培土混和、定植時の土壌混和及び定植当日の散布は合計1回以内、株元処理及び散布は合計3回以内） | セル成型育苗トレイまたはペーパーポットの上から散布する |
|                       |                                 | 6kg/10a   |           |   | 植溝処理土壌混和                    |
|                       | ネギハモグリバエ                        | 5g/培土 <sup>※</sup>                                      | は種時       |   | 育苗培土混和                      |
|                       |                                 | 6kg/10a   | 収穫前日まで    |   | 株元処理                        |
| わけぎ、あさつき              |                                 |   | 定植時       | 1回  | 植溝処理土壌混和                    |
| しゅんぎく                 | アブラムシ類<br>コナジラミ類<br>マメハモグリバエ    | 9kg/10a   | 定植時       | 本剤：1回<br>ニテンピラム：2回以内（定植時の土壌混和は1回以内、株元処理は1回以内）                         | 生育期株元処理                     |
|                       |                                 |   | 収穫3日前まで   |   | 植溝処理土壌混和                    |
| すいぜんじな                | アザミウマ類<br>アブラムシ類<br>マメハモグリバエ    | 9kg/10a   | 定植時       | 本剤：1回<br>ニテンピラム：2回以内（定植時の土壌混和は1回以内、株元処理は1回以内）                         | 植溝処理土壌混和                    |
|                       |                                 |   | 収穫3日前まで   |   | 生育期株元処理                     |

|                 |                                   |                         |              |   |          |
|-----------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------|---|----------|
| とうがらし類（ししとうを除く） | アブラムシ類<br>ミナミキイロアザミウマ             | 1～2 g/株                 | 定植時          | 本剤：1回<br>ニテンピラム：4回以内（育苗期の<br>株元処理及び定植時の土壌混和は<br>合計1回以内、散布は3回以内） | 植穴処理土壌混和 |
| レタス             | ナモグリバエ                            | 0.5～1 g/株               | 育苗期後半        | 本剤：1回<br>ニテンピラム：4回以内（育苗培<br>土混和及び育苗期の株元処理は合<br>計1回以内、散布は3回以内）   | 株元処理     |
|                 |                                   | 10 g/培土 <sup>1</sup> kg | は種時          |   | 育苗培土混和   |
| 食用ぎく            | アブラムシ類<br>ミカンキイロアザミウマ<br>マメハモグリバエ | 2 g/株                   | 収穫前日ま<br>で   | 2回以内  | 生育期株元散布  |
| ズッキーニ           | アザミウマ類                            | 1～2 g/株                 | 定植時          | 1回  | 植穴処理土壌混和 |
| うり類（漬物用）        | アブラムシ類                            |                         |              |   |          |
| 稲               | カメムシ類                             | 4 kg/10 a               | 収穫14日前<br>まで | 4回以内  | 散布       |
|                 | ツマグロヨコバイ<br>ウンカ類                  | 3～4 kg/10 a             |              |   |          |

【効果・薬害等の注意】

- ① トマト及びなすの鉢上げ時においては、直径9 cm程度の鉢までとしてください。
- ② 使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所又は販売店等と相談することが望ましいです。
- ③ 水稻に使用する場合は3 cm前後の湛水とし、田面に均一に散布し、散布後4～5日間は湛水状態を保ち、散布後7日間は落水やかけ流しはしないでください。漏水のほ  
げしい水田では使用しないでください。
- ④ 適用作物群に属する作物またはその新品種に本剤をはじめて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、普及  
指導センター、病害虫防除所または販売店等と相談することが望ましいです。

【安全使用上の注意】 マスク着用

- ① 体調のすぐれない時は散布しないでください。
- ② 散布時は、農業用マスクなどを着用してください。作業後はうがいをしてください。
- ④ 散布中や散布当日は散布区域に小児やペットが立ち入らないように配慮してください。
- ⑤ 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
- ⑥ ミツバチに対して影響があるので、ミツバチの巣箱及びその周辺にかからないようにしてください。
- ⑦ マルハナバチを利用する場合、本剤使用後20日目ごろより後に導入してください。ただし、影響日数は環境条件により多少変動する場合がありますので注意してくださ  
い。
- ⑧ 使用後の空容器は良くたたいて中身を完全にだしてから処理してください。